



توجه

در صورت غیر فعال بودن دکمه‌ها در سیستم عامل اندروید،
حتما اپلیکیشن Google Drive خود را به روز رسانی نمایید.

If the buttons are disable in the Android system,
Be sure to update your Google Drive app.

Start

Select
Language

Farsi | فارسی

English

مشاهده

BARIVITAL



برای دسترسی به فهرست کاتالوگ
در هر بخش از این دکمه استفاده کنید.

متوجه شدم

برای بازگشت در هر مرحله از این دکمه
استفاده کنید.



بازگشت



باری ویتال

Quali

is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com

شروع

SMART
CATALOG

BARI VITAL / 2021 - 1.0

محتویات این کاتالوگ متعلق
به باری ویتال می باشد.

© BARI VITAL, All right reserved



برای شروع یکی را انتخاب کنید:

باری ویتال مکمل ایده‌ال

مشاهده محصولات

تماس با ما



تعریف سازمان غذا و داروی آمریکا FDA مکملهای رژیمی - غذایی فرآورده هایی هستند که:

۱- حاوی مواد مغذی بوده، و فقدان یا کمبود یک یا چند ماده مغذی اولیه در رژیم غذایی را تکمیل می نمایند.

۲- از طریق ارتقاء عملکرد و یا پیشگیری از اختلالات دستگاههای مختلف بدن موجبات افزایش سلامت را فراهم می کنند.

۳- هیچگونه ادعای تشخیصی، پیشگیری و یا درمانی از یک بیماری خاص را ندارند.

۴- شامل یکی از مولد زیر می باشند. ویتامین ها، املاح، گیاهان و مواد طبیعی، اسیدهای آمینه و هر ماده رژیمی دیگری که به منظور افزایش TDI (Total Dietary Intake) مورد استفاده قرار گیرد و یا هر ماده تغلیظ شده، متابولیت شده، تشکیل شده، استخراج شده و یا ترکیب شده از مواد و اجزاء احصاء شده قبلی را شامل می شود.

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA مواد را مکمل دارویی می داند که علاوه بر کاربرد های اشاره شده، شامل ویژگی های زیر نیز باشد:

۱- کیفیت تولید آن بسیار بالا باشد.

۲- حاوی آلاینده یا ناخالصی نباشد.

۳- برچسب آن بسیار دقیق و با ذکر جزئیات باشد.

ادامه مطلب



بازگشت



باری ویتال

Quali is a Trademark of DSM

یکی از مهمترین عوامل در کیفیت محصولات و همچنین نداشتن آلاینده و ناخالصی، مواد اولیه می باشد.

مواد اولیه کلیه محصولات باریویتال تامین شده از شرکت DSM سوئیس می باشد. رویال دی اس ام (Royal DSM) که به دی اس ام مشهور است، یک شرکت چند ملیتی در زمینه علوم زیستی و علوم مواد است. این شرکت، محصولات چوبی انواع مواد و مکمل های غذایی، مواد دارویی و پزشکی، انواع رنگ را در بازارهای بین المللی، ارائه می نماید.


بخش محصولات غذایی DSM پیشرو در جهان ویتامین ها، کاروتنوئیدها و سایر مواد شیمیایی باکیفیت در صنایع غذایی، دارویی و مراقبت شخصی است. این سازمان یک نام شناخته شده به عنوان پیشگام در کشف محصولات جدید، فرمولاسیون جدید و کاربردهای جذاب برای همه بخش های صنعت است.

علامت Quali™ نام تجاری ثبت شده شرکت DSM سوئیس می باشد.



برای مشاهده صفحات دیگر از این دکمه ها استفاده کنید.

متوجه شدم



کپسول نرم امگا ۳ (روغن ماهی) باریویتال

تعداد: ۶۰ کپسول

مشاهده



شربت باریویتال

حجم: ۲۰۰ میلی گرم

مشاهده



کپسول مولتی ویتامین (بزرگسال باریویتال)

تعداد: ۶۰ کپسول

مشاهده



کپسول نرم ویتامین D۳ باریویتال

تعداد: ۳۰ کپسول

مشاهده



کپسول نرم کلسیم باریویتال

تعداد: ۳۰ کپسول

مشاهده



کپسول نرم مگا امگا (Omega 3,6,7,9)

تعداد: ۶۰ کپسول

مشاهده





کپسول نرم ویتامین ویتامین E 400

تعداد: ۳۰ کپسول

مشاهده



Quality
is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



کیپسول نرم امگا ۳ (روغن ماهی) باریویتال
۶۰ کیپسول

توضیحات بیشتر

بازگشت



کپسول نرم امگا ۳ (روغن ماهی) باریویتال

موارد مصرف:

کمک به کاهش کلسترول، کمک به سلامت قلب و عروق، کمک به کاهش التهاب

ترکیبات:

هر کپسول نرم حاوی ۱۰۰۰ میلی گرم روغن ماهی شامل ۱۸۰ میلی گرم ایکوزاپنتانویک اسید (EPA) و ۱۲۰ میلی گرم دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) و ۷/۵ واحد بین المللی ویتامین ای است.

مقدار مصرف:

روزانه ۱ تا ۳ عدد همراه غذا و یا طبق دستور پزشک مصرف شود. بهتر است این فرآورده همراه غذا و نوشیدنی مصرف شود. این فرآورده بدون شیرین کننده و مصرف آن در افراد مبتلا به دیابت بلامانع است.

منع مصرف و احتیاط:

اگر به هریک از مواد تشکیل دهنده فرآورده حساسیت دارید، از مصرف آن خودداری کنید. مصرف در کودکان فقط با تجویز پزشک مجاز است. در دوران بارداری و شیردهی، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید. در صورت ابتلا به هر نوع بیماری، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید. از مصرف این فرآورده قبل و بعد از انجام هر گونه عمل جراحی خودداری شود. برای اطلاعات بیشتر با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

عوارض جانبی:

اسیدهای چرب امگا-۳ ممکن است سبب بروز نفخ و ناراحتی شکم، تهوع، اسهال و احساس طعم نامطبوع در دهان شوند. مصرف طولانی مدت امگا-۳ ممکن است سبب کمبود ویتامین E در بدن شود. در صورت بروز خونریزی غیر طبیعی، کیودی و سیاه شدن مدفوع، پزشک خود را مطلع سازید. بروز واکنش‌های حساسیتی با این فرآورده نادر است ولی در صورت مشاهده حتماً به پزشک مراجعه نمایید.

تداخلات دارویی:

در صورت لزوم مصرف همزمان با داروهای ضدانعقاد، مکمل‌ها و گیاهان دارای اثرات ضدپلاکتی/ضدانعقادی، ابتدا با پزشک مشورت کنید. مصرف همزمان مکمل‌های روغن ماهی و ویتامین E با داروهای ضدپلاکت، ممکن است خطر خونریزی را افزایش دهد، بدون آنکه INR افزایش یابد. مصرف روغن ماهی همراه با سایر داروهای کاهنده فشار خون می‌تواند باعث کاهش بیش از حد فشار خون شود.

قرص اورلیستات موجب کاهش جذب روغن ماهی می‌شود، بنابراین بین مصرف این فرآورده‌ها باید حداقل ۲ ساعت فاصله باشد.

نکات قابل توصیه:

در مدت استفاده از فرآورده، پایش دوره ای مقدار LDL-C و در بیماران مبتلا به اختلالات کبدی، پایش دوره ای ALT و AST توصیه می‌شود.



بازگشت

Qual
is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



شربت باریویتال

حجم ۲۰۰ میلی گرم

توضیحات بیشتر

بازگشت



مورد مصرف:

کمک به سلامت عمومی بدن

ترکیبات:

ویتامین A: ۱۵۰۰ واحد بین المللی | ویتامین D3: ۴۰۰ واحد بین المللی | ویتامین E: ۳ میلی گرم | ویتامین B1: ۱/۵ میلی گرم | ویتامین B2: ۱/۵ میلی گرم | ویتامین B6: ۱ میلی گرم | ویتامین B12: ۱/۵ میکروگرم | د-پانتوتول: ۱/۵ میلی گرم | نیاسین آمید: ۵ میلی گرم | ویتامین C: ۳۰ میلی گرم | ال-لیزین: ۴۰ میلی گرم | آهن: ۵ میلی گرم | روی: ۵ میلی گرم | منیزیم: ۱۰ میلی گرم

عوارض جانبی:

با مصرف مقدار توصیه شده، عارضه جانبی گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه:

- فرآورده را از دید و دسترس کودکان دور نگهدارید.
- قبل از مصرف، شیشه را خوب تکان دهید.
- بلافاصله پس از مصرف، درب فرآورده را محکم ببندید.
- فرآورده را دور از نور مستقیم خورشید، در دمای ۱۵-۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
- فرآورده را از یخ زدگی محافظت کنید.
- در صورت تغییر رنگ فرآورده به تیره، مصرف آن بلامانع است.
- به تاریخ انقضاء مصرف فرآورده توجه داشته باشید.



بازگشت

Qual
is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



کپسول مولتی ویتامین (بزرگسال باریویتال)
۶۰ کپسول

توضیحات بیشتر

بازگشت

کپسول مولتی ویتامین (بزرگسال باریوتال)



موارد مصرف:

افزایش کارایی بدن و جلوگیری از خستگی
کمک به بهبود شرایط روحی و روانی و افزایش تمرکز ذهنی
کمک به بهبود علائم عمومی ناشی از افزایش سن
پیشگیری از کمبود ویتامین
کمک به بازتوانی بدن در دوره نقاهت (پس از بیماری‌ها، عفونت‌ها، اعمال جراحی و ...)

ترکیبات:

هر کپسول حاوی ۱۲ ویتامین مختلف، ۸ ماده معدنی مورد نیاز، اسیدهای آمینه ضروری ال - لیزین، ال - سیترولین و نیز لوتئین (ویتامین چشم)، اینوزیتول و لیکوپن است.

مقدار مصرف:

روزی ۱ کپسول هنگام صبحانه با یک لیوان آب میل شود. اگر مصرف فرآورده را فراموش کردید؛ به محض یادآوری، مقدار فراموش شده را مصرف کنید. در صورتی که نزدیک به زمان مصرف مقدار بعدی، متوجه فراموش شدن مصرف فرآورده شدید، تنها مقدار بعدی را مصرف کنید. برای جبران مقدار فراموش شده هرگز فرآورده را به میزان دو برابر مصرف نکنید. علائم مصرف بیش از اندازه این فرآورده کاملاً شناخته شده نیست. درباره علائم مصرف بیش از اندازه هر یک از ترکیبات فرآورده با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

منع مصرف و احتیاط:

اگر همراه با این فرآورده داروی دیگری مصرف می‌کنید، یا قصد مصرف داروی دیگری را دارید و یا اخیراً داروی خاصی را مصرف کرده‌اید؛ با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

عوارض جانبی:

مانند سایر فرآورده‌های مکمل، این فرآورده نیز می‌تواند منجر به عوارضی شود که در افراد مختلف یکسان نیست. از آنجاکه هیچ مطالعه بالینی برای بررسی شیوع این عوارض صورت نگرفته است، میزان شیوع آن‌ها نیز ناشناخته است. در صورت بروز هر نوع عارضه ناخواسته، مصرف فرآورده را متوقف نموده و با پزشک خود مشورت کنید.

نکات قابل توصیه:

در صورت بروز واکنش‌های حساسیتی، مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود.
در دوران بارداری و شیردهی، تصمیم برای برداشتن و یا احتمال بارداری؛ قبل از مصرف، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
بهتر است این فرآورده همراه غذا و نوشیدنی مصرف شود.
این فرآورده بدون شیرین کننده است و مصرف آن در افراد مبتلا به دیابت بلامانع است.



بازگشت



کپسول نرم ویتامین D3 باریویتال

۳۰ کپسول

توضیحات بیشتر



کیپسول نرم ویتامین D3 باریویتال

مورد مصرف:

روزی یک کیپسول نرم به همراه یک لیوان آب میل شود. اگر مصرف فرآورده را فراموش کردید، به محض یادآوری، نسبت به مصرف مقدار فراموش شده اقدام کنید. در صورتی که نزدیک به زمان مصرف مقدار بعدی، متوجه فراموش شدن مصرف فرآورده شدید، تنها مقدار بعدی را مصرف کنید. برای جبران مقدار قبلی هرگز فرآورده را به میزان دو برابر مصرف نکنید. علائم مصرف بیش از اندازه این فرآورده کاملاً شناخته شده نیست و می‌تواند به شکل تهوع، استفراغ، اسهال اولیه و به دنبال آن یبوست، بی‌اشتهایی، سستی، سردرد، درد مفاصل و عضلات، آریتمی (ضربان نامنظم قلب)، ازوتمی (افزایش نیترژن خون)، تشنگی، افزایش و تکرر ادرار و در نهایت دهیدراتاسیون (از دست دادن آب بدن) دیده شود.

عوارض جانبی:

در صورت بروز هریک از علائم ذیل، مصرف فرآورده را متوقف نموده و با پزشک تماس بگیرید: مشکلات فکری، تغییر در رفتار و تحریک پذیری؛ ادرار بیش از حد؛ درد قفسه سینه و احساس تنگی نفس؛ نشانه‌های اولیه ناشی از مصرف بیش از اندازه ویتامین D (ضعف، احساس طعم فلزی در دهان، کاهش وزن، درد عضلات یا استخوان، یبوست، تهوع و استفراغ)؛ تورم صورت، لب، زبان یا گلو؛ مشکلات بلع؛ کپیر و مشکل در تنفس.

نکات قابل توصیه:

در صورت بروز واکنش‌های حساسیتی، مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود. در دوران بارداری و شیردهی، تصمیم برای برداشتن و یا احتمال بارداری، قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید. بهتر است این فرآورده همراه غذا و نوشیدنی مصرف شود. در نوزادان و کودکان با مشورت پزشک مصرف گردد.



بازگشت

Qual
is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



کپسول نرم کلسیم باریویتال ۳۰ کپسول

توضیحات بیشتر

بازگشت



کپسول نرم کلسیم باریوتال

ترکیبات:

کلسیم، منیزیم، روغن بزرک، ویتامین D₃ و ویتامین K₁ و ویتامین E

مقدار مصرف:

روزی یک تا سه عدد، ۱ تا ۱/۵ ساعت بعد از غذا به همراه یک لیوان آب مصرف شود. مصرف مکمل های کلسیم باید ۱-۲ ساعت بعد از مصرف غذاهای حاوی فیبر باشد. اگر مصرف فرآورده را فراموش کردید به محض یادآوری، نسبت به مصرف مقدار فراموش شده اقدام کنید. در صورتی که نزدیک به زمان مصرف مقدار بعدی، متوجه فراموش شدن مصرف فرآورده شدید، تنها مقدار بعدی را مصرف کنید. برای جبران مقدار قبلی هرگز فرآورده را به میزان دو برابر مصرف نکنید.

منع مصرف و احتیاط:

فنی توئین و یا باریتورات ها ، گلوکوکورتیکوئیدها ، ریگامپین و ایزونیاژید ، کلسیترامین و مسهل های حاوی پارافین مایع، اکتینومیسین ، تتراسایکلین. مصرف همزمان دیورتیک های تیازیدی، با این فرآورده در موارد خاص و تحت نظارت دقیق پزشک انجام شود. موارد منع مصرف و احتیاط: سابقه تشکیل سنگ کلیه کلسیمی، اختلال در دفع کلسیم و فسفات از طریق کلیه ها، مصرف داروهای مدر، افراد دارای محدودیت شدید حرکتی، بیماری های قلبی، کلیوی، اختلالات الکترولیتی.

عوارض جانبی:

در صورت بروز هر یک از علائم تحریک پذیری، ادرار بیش از حد، درد قفسه سینه و احساس تنگی نفس، تورم صورت، لب، زبان یا گلو، مشکلات بلع، کهیر و مشکل در تنفس، مصرف فرآورده را متوقف و با پزشک تماس بگیرید.

ممکن است اثر یا عوارض جانبی این فرآورده در اثر استفاده همزمان با آنالوگ ها یا متابولیت های ویتامین D (مانند کلسیتریول) افزایش یابد.

در صورت مصرف همزمان این فرآورده با گلیکوزیدهای قلبی مانند دیگوکسین می تواند منجر به افزایش عوارض جانبی این داروها گردد.

نکات قابل توصیه :

در صورت بروز واکنشهای حساسیتی، مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود. در دوران بارداری و شیردهی، تصمیم برای برداشتن و یا احتمال بارداری؛ قبل از مصرف، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

شرایط نگهداری:

فرآورده را از دید و دسترس کودکان دور نگهدارید.

فرآورده دور از نور، در دمای ۱۵-۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.



بازگشت

Qual
is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



کیپسول نرم مگا امگا (Omega3,6,7,9)
۶۰ کیپسول

توضیحات بیشتر

بازگشت

کپسول نرم مگا امگا (Omega3,6,7,9)



موارد مصرف:

تأمین اسیدهای چرب مورد نیاز بدن، آنتی اکسیدان

ترکیبات:

روغن گل مغربی (Oenothera biennis)، زیتون (Olea europaea)

بذر کتان (Linum usitatissimum)، سیوس برنج (Oryza sativa)

سنجد تلخ (Hippophae rhamnoides)

مقدار مصرف:

۲-۳ بار در روز هر بار یک کپسول بلافاصله قبل از غذا یا همراه با غذا میل شود. از مصرف بیش از مقدار توصیه شده روزانه خودداری شود.

منع مصرف:

روغن سنجد تلخ فعالیت سایتوژنتیک سیکلوفسفامید و فرامورویسین را القا میکند. در مورد سایر اجزاء فرآورده مدرکی مبنی بر تداخلات دارویی وجود ندارد.

موارد منع مصرف:

حساسیت شناخته شده نسبت به هر یک از اجزاء فرآورده، در صورت بروز واکنش های حساسیتی، مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود.

بارداری و شیردهی:

اطلاعاتی در مورد ایمنی مصرف و اثربخشی فرآورده در دوران شیردهی و بارداری وجود ندارد.

عوارض جانبی:

موردی گزارش نشده است.

نکات قابل توصیه:

فرآورده را از دید و دسترس کودکان دور نگهدارید.

فرآورده دور از نور، در دمای ۱۵-۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

بلافاصله پس از مصرف، درب فرآورده را محکم ببندید.

از فرآورده های تاریخ گذشته استفاده نکنید.



بازگشت

Qual
is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



کپسول نرم ویتامین E400

۳۰ کپسول

توضیحات بیشتر

بازگشت

کپسول نرم ویتامین E400



موارد مصرف:

کمک به تامین ویتامین ای، آنتی اکسیدان

ترکیبات:

هر کپسول نرم حاوی ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین E است.

مقدار مصرف:

روزی یک کپسول نرم به همراه یک لیوان آب میل شود. اگر مصرف فرآورده را فراموش کردید؛ به محض یادآوری، نسبت به مصرف مقدار فراموش شده اقدام کنید. در صورتی که نزدیک به زمان مصرف مقدار بعدی، متوجه فراموش شدن مصرف فرآورده شدید، تنها مقدار بعدی را مصرف کنید. برای جبران مقدار قبلی هرگز فرآورده را به میزان دو برابر مصرف نکنید. علایم مصرف بیش از اندازه این فرآورده کاملاً شناخته شده نیست و می‌تواند به شکل تاری دید، اسهال، سردرد، سرگیجه، تهوع یا دردهای شکمی، ضعف و خستگی غیرعادی دیده شود.

منع مصرف و احتیاط:

در مورد زیر، کپسول نرم باریویتال® ویتامین ای را با احتیاط مصرف کنید:

مصرف داروهای ضد انعقاد (مانند وارفارین و هپارین)، سابقه ابتلا به بیماریهای انعقادی و بیماری های لرثی خونریزی دهنده، کمبود ویتامین K، ابتلا به بیماری های کبد و یا پانکراس، افراد مستعد خونریزی هایی نظیر زخم معده، سکنه مغزی و هموفیلی.

عوارض جانبی:

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، با مصرف ویتامین ای منابع غذایی مانند روغن جوانه گندم، اسفناج، بروکلی، سویا، انبه؛ عارضه جانبی مشاهده نشده است. مصرف ویتامین ای نسبتاً ایمن است و معمولاً توسط افراد تحمل می شود. اکثر بزرگسالان می‌توانند این ویتامین را روزی ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلی گرم بدون عوارض نامطلوب مصرف کنند. با این حال، مصرف ویتامین ای (به عنوان مثال در دوزهای بیش از ۳۰۰ واحد بین المللی در روز) به ندرت تهوع، اسهال، درد شکمی، گرفتگی روده، خستگی یا ضعف، سردرد، سرگیجه، تاری دید، اختلالات روانی و بثورات جلدی ایجاد می کند. میوپاتی (اختلالات عضلانی)، فشار خون بالا، ترومبوفیلیت (التهاب وریدی مربوط به لخته شدن خون)، درد پستان، کراتینوریا (افزایش غلظت کراتین در ادرار)، افزایش کراتین کیناز سرم، کلسترول سرم و تری گلیسیرید، افزایش استروژن ها و آندروژن ها در ادرار و مشکلات تیروئید نیز از عوارض احتمالی مصرف این ویتامین در دوزهای بالا ذکر شده است. این اثرات عموماً پس از قطع مصرف ویتامین ای از بین می روند. مصرف روزانه دوزهای بیشتر از ۱۰۰۰ میلی گرم ویتامین ای برای مدت طولانی، گاهی اوقات با افزایش خونریزی در بیماران مبتلا به کمبود ویتامین K مانند کسانی که از ضد انعقاد های خوراکی استفاده می کنند، همراه بوده است. همچنین ممکن است خطر ابتلا به ترومبوز در بعضی از بیماران مانند کسانی که از داروهای ضد انعقاد خوراکی یا استروژن استفاده می کنند، افزایش یابد.

در صورت بروز هریک از علایم فوق، مصرف فرآورده را متوقف نموده و با پزشک تماس بگیرید.

ادامه مطلب



بازگشت



کپسول نرم ویتامین E400

نکات قابل توصیه:

تداخلات دارویی: مصرف همزمان ویتامین ای با داروهای ضدانعقاد مانند آسپیرین، وارفارین، هپارین، کلوییدوگرل، تیکلوپیدین و گیاهان دارایی این خاصیت نظیر سیر و جینکو باعث افزایش احتمال خونریزی می شود.

* ویتامین ای ممکن است عوارض جانبی برخی از داروها مانند آمیودارون سیکلوسپورین و زیدوودین را افزایش دهد.

* ویتامین ای ممکن است نیاز به دیگوکسین و یا اتسولین را کاهش دهد. در صورت مصرف همزمان، لازم است وضعیت بیمار کنترل شود.

* اورلیستات ممکن است منجر به کاهش جذب ویتامین ای شود. بنابراین، اورلیستات باید دو ساعت قبل یا دو ساعت پس از مصرف ویتامین ای، مصرف شود.

* سایر داروهایی که ممکن است در جذب ویتامین ای دخالت داشته باشند عبارتند از: کلستیرامین، کولستیپول، روغن های معدنی مانند پارافین خوراکی، ایزونیاژید، نئومایسین و سوکرالفیت.

* مصرف همزمان داروهای ضد تشنج (به عنوان مثال، فنوباریتال، فنی توئین، کاربامازپین) و یا داروهای ضد بارداری خوراکی با این ویتامین، ممکن است سطح پلاسمایی ویتامین ای را کاهش دهد.



بازگشت



باری ویتال



آدرس دفتر مرکزی:

تهران، بلوار مرزداران، بین خیابان آریافر
وسرسبز، پلاک ۷۸



شماره تماس:

۰۲۱-۴۹۹۲۱

بازدید از وبسایت



بازگشت

صفحه نخست

باری ویتال مکمل ایده‌ال

مشاهده محصولات

تماس با ما

تغییر زبان

Select
Language

Farsi | فارسی

English

Start

BARI VITAL



Use this button to access
the catalog list in each section.

I Realized

To return to each step of
the button use.



Back



BARI VITAL

Quali

is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com

Start

**SMART
CATALOG**

BARI VITAL / 2021 -1.0

The contents of this catalog are under
the exclusive control of Barij Essence.

© BARI VITAL, All right reserved



Select The Desired Option:

About **Bari Vital** co.

Product Index

Contact us



 Quali is a Trademark of DSM

Barij Essential Pharmaceutical Industrial Group, in order to improve the health of the community and also to meet the needs created in it, has produced food and diet supplements under the Baritalial brand. Raw materials for all Barital products are provided by DSM. Royal DSM, also known as Dysam, is a Dutch multinational biosciences and materials science company. The company offers products such as a variety of food supplements, pharmaceuticals and medical products, a variety of dyes in international markets. DSM Food Products is a leader in the production of quality vitamins, carotenoids and other chemicals in the food, pharmaceutical and personal care industries. This organization is a well-known name as a pioneer in the production of new products, new formulations, etc. Barij essential oil specialists are working around the clock so that there is no shortage of health products in the community and the dear people of our country do not face problems in supplying their medicines.

[Read more](#)



[Back](#)




 Quali is a Trademark of DSM

Barij Essential Pharmaceutical Industrial Group, in order to improve the health of the community and also to meet the needs created in it, has produced food and diet supplements under the Barital brand. Raw materials for all Barital products are provided by DSM. Royal DSM, also known as Dysam, is a Dutch multinational biosciences and materials science company.



To view other pages of these
buttons use.

I Realized





Omega-3 Fish oil

pcs: 60 Capsules

[View](#)



Syrup Barivital

Volume: 200 ml

[View](#)



General Multivitamin+Mineral

pcs: 60 Capsules

[View](#)



[Back](#)



Vitamin D3 Soft Capsule

pcs: 30 Capsules

[View](#)



Calcium Soft Capsule

pcs: 30 Capsules

[View](#)



Mega Omega (Omega 3,6,7,9)

pcs: 60 Capsules

[View](#)



[Back](#)



Vitamin E
pcs: 30 Capsules

[View](#)



[Back](#)

Qual

is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



Omega 3 Bariovital Fish Oil

60 Capsules

[More Details](#)

[Back](#)

Omega 3 Bariovital Fish Oil



Dosage form and Packaging:

Container with 60 soft capsules and patient information leaflet in cardboard box.

Ingredients:

Each soft capsule contains 1000 mg of fish oil containing 180 mg of eicosapentaenoic acid (EPA) and 120 mg of docosahexaenoic acid (DHA) and 7.5 international units of vitamin E.

Therapeutic and Medicinal effects:

This product is a rich combination of polyunsaturated fatty acids EPA (eicosapentaenoic acid) and DHA (docosahexaenoic acid) derived from standard fish oil and vitamin E. The different mechanisms of EPA and DHA in protecting the heart are due to the lowering effects on triglycerides, lowering blood pressure, reducing platelet aggregation, and reducing the heart's susceptibility to ventricular arrhythmias. Recommended by the American Heart Association for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease in women is taking omega-3 fatty acids or supplement capsules (eg. EPA 1800 mg daily) in women with high cholesterol and / or triglyceride.

Indications:

Helps lower cholesterol, helps cardiovascular health, helps reduce inflammation

Dosage and Administration:

Take 1 to 3 soft capsules daily with food or as directed by your doctor. It is best to consume this product with food and drink. This product is without sweetener and its consumption is unrestricted in people with diabetes.

Contraindications and Cautions:

If you are allergic to any of the ingredients in the product, do not use it. Use in children is allowed only with a doctor's prescription. During pregnancy and lactation, consult your doctor or pharmacist before use. If you have any illness, consult your doctor or pharmacist before use. Do not use this product before and after any surgery. Consult your doctor or pharmacist for more information.

Adverse Effects:

Omega-3 fatty acids can cause bloating and upset stomach, nausea, diarrhea and bad taste in the mouth. Long-term consumption of omega-3 may cause vitamin E deficiency in the body. Tell your doctor if you have abnormal bleeding, bruising, or black stools. Allergic reactions to this product are rare, but be sure to see your doctor if you notice.

[ReadMore](#)



[BACK](#)

Omega 3 Bariovital Fish Oil



Drug Interactions:

Consult your doctor first if you need to take anticoagulants, supplements and herbs with anticoagulant/ anticoagulant effects simultaneously. Concomitant use of fish oil and vitamin E supplements with antiplatelet drugs may increase the risk of bleeding without increasing the INR. Taking fish oil with other antihypertensive drugs can cause excessive blood pressure lowering. Orlistat tablets reduce the absorption of fish oil, so there should be at least 2 hours between the consumption of these products.

Recommended tips:

Periodic monitoring of LDL-C is recommended during use of the product and periodic monitoring of ALT and AST is recommended in patients with liver disorders.



BACK

Qual

is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



Syrup Barivital

200 milliliter

[More Details](#)

[Back](#)

Syrup Barivital



Indications:

Contribute to the overall health of body

Composition:

Each 5 ml contains:

Vitamin A: 1500 IU | Vitamin D3: 400 IU | Vitamin E: 3 mg | Vitamin B1: 1.5 mg | Vitamin B2: 1.5 mg | Vitamin B6: 1 mg | Vitamin B12: 1.5 mcg | D - panthenol: 2.5 mg | Niacinamide: 5 mg | Vitamin C: 30 mg | L - Lysine: 40 mg | Iron: 5 mg | Zinc: 5 mg | Magnesium: 10mg

Adverse effects:

No adverse effects have been reported at the recommended dose.

Attentions:

Keep out of the sight and reach of children.

Shake well before use.

Keep tightly closed immediately after use.

Keep in 15-30oC, away from direct sunlight.

Do not freeze.

If the color of the product changes to dark, it can be used.

Note the expiry date of the product.



BACK

Qual

is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



General Multivitamin+Mineral

60 Capsules

[More Details](#)

[Back](#)

General Multivitamin+ Mineral



Dosage form and Packaging:

Capsule with information leaflet in cardboard box

Ingredient:

Each capsule contains 12 different vitamins, 8 required minerals, essential amino acids; L-lysine, L-citrulline and also lutein (eyes vitamin), inositol and lycopene that recommended for the age group of 19 to 50 years.

Indications:

Increase body performance and prevent fatigue

Helping improve mental health and concentration

Helping to improve general symptoms caused by aging

Preventing the loss of vitamins and minerals

Helping to rehabilitate the body in recovery (after diseases, infections, surgeries, etc.)

Dosage and Administration:

One capsule daily at breakfast with a glass of water. If you forget the consumption of the product; as soon as you remember, take the forgotten dose. If the dose is about the next time you are taking, do not use the forgotten dose. Avoid taking more medicine to compensate for a forgotten dose. Symptoms of excessive consumption of this product are not well-known. Consult with your doctor or pharmacist about the symptoms of over-consumption of each component of the product.

Side Effects:

Like other supplements, this product can also lead to side effects that are not the same in different people. The prevalence of side effects is unknown because no clinical study has been conducted to evaluate the incidence of them. If you have any unwanted side effects, stop taking the product and consult your doctor.

Interactions:


Consult your doctor or pharmacist if you are taking another medicine with this product, or plan to use another medication or have recently taken some special medication.



BACK

Qual

is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



Vitamin D3 Soft Capsule

30 Capsules

[More Details](#)

[Back](#)

Vitamin D3 Soft Capsule



Dosage and Administration:

Take one soft capsule with a glass of water daily. If you forget the consumption of the product; as soon as you remember, take the missed dose. If it is close to the next dose, do not take the missed one and avoid doubling the dose. Symptoms of excessive consumption of this product are not well-known and it might cause of nausea, vomiting, diarrhea followed by constipation, anorexia, weakness, headache, joint pain and muscle pain, arrhythmias (irregular heartbeats), azotemia (increased blood nitrogen), thirst, increased and frequent urination and eventually dehydration (loss of body water).

Adverse Effects and Attentions:

If any of the following symptoms occur, stop taking the product and contact your doctor:

Intellectual problems changes in behavior and irritability; excessive urine; chest pain and shortness of breath; early symptoms of excessive intake of vitamin D (weakness, metal taste in the mouth, weight loss, muscle or bone pain, constipation, nausea and vomiting); swelling of the face, lips, tongue or throat; swallowing difficulties; hives and difficulty in breathing.

Attentions:

If allergic reactions occur, stop taking the medicine and consult your physician.

Consult your physician or pharmacist before taking during pregnancy and lactation, decision to become pregnant, or pregnancy probability.

It is better to take this product with food and drink.

Consult with your doctor for use in babies and children.



BACK

Qual

is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



Calcium Soft capsule

30 Capsules

[More Details](#)

[Back](#)

Calcium Soft Capsule



Ingredient:

Calcium, magnesium, flaxseed oil, vitamin D3, vitamin K1 and vitamin E.

Dosage and Administration:

Take one to three soft capsules daily 1.0 -1.5 hours after after meals food with a glass of water. Consumption of calcium supplements should be 1-2 hours after consuming fiber containing foods. If you forget the consumption of the product; as soon as you remember, take the forgotten dose. If the dose is about the next time you are taking, do not take the forgotten dose. Avoid doubling the dose to compensate for a forgotten dose.

Adverse effects:

If you have any symptoms of irritability, excessive urination, chest pain and shortness of breath, swelling of the face, lips, tongue or throat, swallowing problems, hives and difficult breathing, stop taking the product and contact your doctor.

The efficacy or side effects of this product may be increased by the concomitant use of analogues or metabolites of Vitamin D (such as calcitriol).

Concomitant use of this product with cardiac glycosides such as digoxin can increase the side effects of these drugs.

Notes:

In case of allergic reactions, stop taking the medicine and consult your doctor. During pregnancy and breast-feeding or decide to become pregnant, consult with your physician or pharmacist before taking the product.



BACK

Quality

is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



Mega Omega(omega 3,6,7,9)
60 Capsules

[More Details](#)

[Back](#)

Mega Omega (omega 3,6,7,9)



Indications:

Providing the fatty acids needed by the body
Antioxidant

Ingredient:

Oenothera biennis, Olea europaea, Linum usitatissimum, Oryza sativa and Hippophae rhamnoides

Dosage and Administration:

2-3 times a day, each time a capsule is taken immediately before meals or with meals. Avoid from taking more than the recommended daily amount.

Interactions:

Sea-buckthorn oil induces the cytogenetic activity of cyclophosphamide and pharmorubicin. There is no evidence of drug interactions with other components of the product.

Contraindications:

Known sensitivity to each component of the product; if allergic reactions occur, stop taking the medicine and consult your doctor.

Pregnancy and Lactation:

There is no information on the safety and efficacy of the product during lactation and pregnancy.

Adverse effects:

No cases reported.

Storage:

Keep out of the sight and reach of children.

Keep in 15 - 30°C, away from light.

Keep tightly closed immediately after use.

Do not use the expired products.



BACK

Qual

is a Trademark of DSM
www.qualityforlife.com



Vitamin E Soft Capsule

30 Capsules

[More Details](#)

[Back](#)

Vitamin E Soft Capsule



Indications:

To help supply vitamin E, Antioxidant

Ingredient:

Each soft capsule contains 400 IU of vitamin E

Dosage and Administration:

Take one soft capsule with a glass of water daily. If you forget the consumption of the product; as soon as you remember, take the missed dose. If close to the time of the next intake, consumption realized forgotten, you just take the next dose. Never use the product twice as much as you can to compensate for the previous amount. Symptoms of excessive consumption of this product are not well-known and it can be seen in the form of blurred vision, diarrhea, headache, dizziness, nausea, or abdominal pains, weakness and abnormal fatigue.

Attentions:

In the following cases, take Barivital® vitamin E soft capsules with caution:

Use of anticoagulants (such as warfarin and heparin), a history of coagulation and hereditary hemorrhagic diseases, vitamin K deficiency, liver or pancreatic diseases, people who are prone to bleeding such as stomach ulcer, stroke and hemophilia.

Adverse Effects and:

According to research, with vitamin E consumption of food sources such as wheat germ oil, spinach, broccoli, soybeans, mangoes, side effects have not been observed. Vitamin E consumption is relatively safe and is usually tolerated by individuals. Most adults can take this vitamin every day from 100 to 800 milligrams without adverse effects. However, Vitamin E consumption (for example, in doses of more than 300 IU per day) rarely causes nausea, diarrhea, abdominal pain, cramps, fatigue or weakness, headache, dizziness, blurred vision, mental disorders and rash. Myopathy (muscle disorders), high blood pressure, thrombophlebitis (inflammation of the vein related to blood clotting), breast pain, creatinuria (increased creatine concentration in the urine), increased serum creatine kinase, serum cholesterol and triglyceride, increased estrogen and androgens in the urine and thyroid problems are also possible side effects due to the overdose of this vitamin. These effects usually eliminated after discontinuation of vitamin E.

Daily intake of more than 1000 mg of vitamin E for a long time, ...

[ReadMore](#)



[BACK](#)

Vitamin E Soft Capsule



sometimes causes an increase in bleeding in patients with vitamin K deficiency like those who use oral anticoagulants. It is also possible that the risk of thrombosis increases in some patients, such as those use anticoagulant or estrogen.

In case of any of the above symptoms, stop taking the product and contact your doctor.

Interactions:

Concomitant use of vitamin E with anticoagulants such as aspirin, warfarin, heparin, clopidogrel, ticlopidine and the plants with the same properties such as garlic and ginkgo, increases the chance of bleeding.

Vitamin E may increase the side effects of some medications, such as amiodarone, cyclosporine and zidovudine.

Vitamin E may reduce the need for digoxin or insulin. Patients should be monitored if these medications are simultaneously taken.

Orlistat may reduce the absorption of vitamin E. Therefore, it should be taken two hours before or two hours after taking vitamin E.

Other medications that may interfere with vitamin E absorption include: cholestyramine, colestipol, mineral oils such as oral paraffin, Isoniazid, neomycin and sucralfate.

Concomitant use of anticonvulsants (for example; phenobarbital, phenytoin, carbamazepine) or oral contraceptives with this vitamin, may reduce the plasma levels of vitamin E.



BACK
.....



BARI VITAL



theAddressofCentraloffice:
Tehran, MarzdaranBoulevard,
betweenAriafarandSarsabzstreets,
No.78



PhoneNumber:
021-49921

Visit the website



Back

[Home Page](#)

[Bari-Vital is the Ideal Complement](#)

[Products Show](#)

[Contact Information](#)

[Change Language](#)
